

BOLLETTINO

DEI

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

N. 549 pubblicato il 27 Febbraio 1907

Vol. XXII

SPEDIZIONE AL RUWENZORI

DI

S. A. R. LUIGI AMEDEO DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI

XIII.

Prof. FILIPPO SILVESTRI

CRYPTOPS Aloysii Sabaudiae nov. spec.

(DIAGNOSI PREVENTIVA)

Ochroleucus capite ochraceo, setis brevibus parum numerosis instructus.

Caput: lamina cephalica sulcis duobus posticis submedianis abbreviatis antrorsum parum convergentibus exarata et punctis minimis nonnullis impressa. Antennae breves, 17-articulatae, resupinae segmentum secundum superantes, articulo decimo aequo longo atque lato. Pedes maxillares subcoxis antice parum productis, externe sat rotundatis, in medio paullulum sinuatis et in margine ipso setis attenuatis 3+3 instructis, ungue terminali longo, attenuato.

Truncus: tergum primum sulco transversali antico a lamina cephalica partim oblecto et sulcis duobus submedianis parallelis distincte exaratum, tergita coetera sulcis duobus submedianis et a tertio sulcis duobus sublateralibus exarata. Sternita laevia, cruciatim sulcata. Sternitum ultimum partem posticam versus aliquantum angustatum, angulis posticis rotundatis, setis nonnullis instructum.

Pedes setis sat numerosis et sat robustis instructi tarso uniarticulato. Pedes penultimi setis tantum sparsis in articulis distalibus et etiam spinis nonnullis in articulis basalibus aucti. Pedes ultimi subcoxis poris paucis 11-12, spatio permagno subcozarum marginem posti-

cum haud attingentibus, et setis nonnullis auctis, coxa et femore interne spinis sat numerosis armatis et coxa etiam dente apicali interno, tibia dente apicali externo parvo et dentibus 5 inferis aucta, articulo primo tarsali dentibus 2 infra armato.

Long. corp. ad mm. 12.

Habitat: Butiti.

Osservazione. Questa specie è molto affine al *Cryptos numidicus* Lucas, però è ben distinta per il numero minore dei pori alle subcoxe dell'ultimo segmento, per il numero dei denti della tibia e del tarso delle ultime zampe, nonchè per la forma e per le setole delle subcoxe dei piedi mascellari.

